

BASAGRO

SOLUCIÓN POTÁSICA PARA APLICACIÓN AL SUELO

HUMI-K

El potasio es el regulador osmótico de las plantas. Mantiene la turgencia y dureza de los tejidos vegetales. Además el potasio activa más de 50 complejos enzimáticos del metabolismo de las plantas (fotosíntesis, respiración, transporte de carbohidratos,...). Los cultivos lo requieren en gran demanda y su carencia es junto a la del nitrógeno una de las más restrictivas para el cultivo.

BASAGRO HUMI-K aporta y corrige las carencias de potasio en todo tipo de cultivos. Los humatos potásicos consiguen elevar la concentración de potasio en la solución del suelo, de forma mucho más eficiente que cualquier sal potásica. Está especialmente recomendado para su aporte vía radicular en los momentos de mayor demanda de los cultivos (crecimiento de frutos, maduración, encañado, golpes de calor...).

COMPOSICIÓN	% p/p
Óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua	14,8 (18,2 p/v)
Extracto húmico total	6,9 (8,5 p/v)
Ácidos húmicos	5,5 (6,8 p/v)
Ácidos fúlvicos	1,4 (1,7 p/v)

VENTAJAS AGRONÓMICAS

1. Aumenta el tamaño y calidad de los frutos, granos y hortalizas.
2. Incrementa la formación y translocación de azúcares simples y compuestos en los frutos.
3. Reduce la transpiración, evitando pérdidas de agua en momentos de sequía o elevadas temperaturas y mantiene la turgencia de los tejidos vegetales.
4. Endurece los tejidos, aumentando la resistencia frente a plagas y enfermedades.
5. Aumenta la concentración de potasio en la solución del suelo. Incrementa la absorción de potasio vía radicular, de forma más eficiente que cualquier sal potásica.

DOSIFICACIÓN

Tipo de cultivo	Dosis	Aplicación
Tomates, calabazas, melones, pimientos	50-150 l/ha	Cada 2 semanas durante el crecimiento del fruto
Cultivos extensivos	50 l/ha	1 a 2 aplicaciones después de ahijamiento
Lechuga, cebolla, brasicas, apio, espinacas	40-100 l/ha	3-4 aplicaciones desde el cuajado de los frutos
Leñosas	50-150 l/ha	3-4 aplicaciones desde el cuajado de los frutos
Algodón	30-50 l/ha	Después de la floración, en dos aplicaciones

Aplicación radicular

Aplicar entre 100 y 300 L/ha en intervalos de 15 - 30 días desde el inicio del ciclo.



Gestió i assessoria de finques Auditories internes
Fitosanitaris Llavors Compra-venda de Cereals

5 l
20 l
200 l
1000 l

