

# BASAGRO

## SOLUCIÓN POTÁSICA PARA APLICACIÓN FOLIAR Y AL SUELO

# K-30

El potasio es el regulador osmótico de las plantas. Mantiene la turgencia y dureza de los tejidos vegetales. Además el potasio activa más de 50 complejos enzimáticos del metabolismo de las plantas (fotosíntesis, respiración, transporte de carbohidratos,...). Los cultivos lo requieren en gran demanda y su carencia es junto a la del nitrógeno una de las más restrictivas para el cultivo.

BASAGRO K-30 aporta y corrige las carencias de potasio en todo tipo de cultivos. Se recomienda aplicar BASAGRO K-30 en los momentos de máxima necesidad de este elemento, como resulta ser la etapa de engorde del fruto (aumenta el calibre, mayor turgencia e incrementa los niveles de azúcar del fruto).

COMPOSICIÓN	% p/p
Óxido de potasio (K <sub>2</sub> O) soluble en agua	30

### VENTAJAS AGRONÓMICAS

1. Aumenta el tamaño y calidad de los frutos, granos y hortalizas.
2. Incrementa la formación y translocación de azúcares simples y compuestos en los frutos.
3. Reduce la transpiración, evitando pérdidas de agua en momentos de sequía o elevadas temperaturas y mantiene la turgencia de los tejidos vegetales.

4. Endurece los tejidos, aumentando la resistencia frente a plagas y enfermedades.

5. El formulado se presenta en forma de carbonato potásico que es, gracias a su bajo punto de deliquesencia, absorbible por las plantas en condiciones adversas (elevadas temperaturas y bajas humedades relativas).

### DOSIFICACIÓN

Tipo de cultivo	Dosis	Aplicación
Tomates, calabazas, melones, pimientos	5-20 l/ha	Cada 2 semanas durante el crecimiento del fruto
Cultivos extensivos	3-6 l/ha	1 a 2 aplicaciones después de ahijamiento
Lechuga, cebolla, brasicas, apio, espinacas	5-20 l/ha	3-4 aplicaciones desde el cuajado de los frutos
Leñosas	5-20 l/ha	3-4 aplicaciones desde el cuajado de los frutos
Algodón	5-10 l/ha	Después de la floración, en dos aplicaciones

#### Aplicación foliar

Aplicar en pulverización foliar, disuelto en agua a dosis de entre 3 y 10 L.

#### Aplicación radicular

Aplicar entre 10 y 20 L/ha en intervalos de 15 - 30 días desde el inicio del ciclo.



Gestió i assessoria de finques Auditories internes  
Fitosanitaris Llavors Compra-venda de Cereals

5 l  
20 l  
200 l  
1000 l

